

Brandbaarheid vegetatie: Uitgebreide lijst tbv toepassing preventie													
Uitgangspunt is: waardering in droge periode													
Vegetatie	BEGROEIINGSCYCLUS									REST PRODUCTEN			
	maart - mei			juni - augustus			september - februari			NAALDEN en/of BLADEREN op de grond	TAK & TOPHOUT	HUMUS	Opmerkingen: ■ Groeiseizoen is afhankelijk van de temperatuur in het voorjaar en de droogte in de zomer. ■ Bij een temperatuur van ongeveer 10° C begint de sapstroom in het voorjaar opgang te komen. ■ Bij een droge zomer verloopt de omzetting van vocht naar hars sneller. Hierdoor zijn de naalden van het naaldhout sneller brandbaar.
	sapstroom in werking			omzetting in hars			hars OF vallen van naalden						
													
	< 15 jaar	15 - 30 jaar	> 30 jaar	< 15 jaar	15 - 30 jaar	> 30 jaar	< 15 jaar	15 - 30 jaar	> 30 jaar				
Naalddhout													
Abies alba (gewone zilverspar)													
Abies normandii (nordmann zilverspar)													
Abies grandis (zilverspar)													
Cedrus deodara (ceder)													
Larix decidua (europese larix) <u>naaldverliezend</u>													
	naaldverliezend jonge naalden	naaldverliezend jonge naalden	naaldverliezend jonge naalden				vallen naalden	vallen naalden	vallen naalden				
Larix kaempferi (japanse larix)													
	naaldverliezend jonge naalden	naaldverliezend jonge naalden	naaldverliezend jonge naalden				vallen naalden	vallen naalden	vallen naalden				
Picea abies (fijnspar)													
Pinus nigra nigra (oosterijkse den)													
Pinus nigra maritima (corsicaanse den)													
Pinus pinaster (zeeden)													
Pinus strobus (weymouthsden)													Zeer brandbaar, harsdruppels op de stam
Pinus sylvestris (grove den)													
Pinus sylvestris (solitaire 'vliegden')													Is een solitaire grove den in bijv de heide. Volwassen boom heeft takken tot aan de grond.
Pseudotsuga menziesii (gewone douglas)													
Thuja plicata (reuzen levensboom)													
Tsuga heterophylla (westerse hemlockspar)													
Loofhout													
Acer platanoides (noorse esdoorn)													Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
Acer pseudoplatanus (gewone esdoorn)													
Betula pendula (ruwe berk)													
Castanea sativa (tamme kastanje)													Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
											dorblad		
Fagus sylvatica (gewone beuk)													Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom		dorblad		Droogte gevoelige boom. Blad verdort bij droogte en is dus brandbaar
Fraxinus excelsior (gewone es)													
Juglans regia (walnoot)													
Populus alba (witte populier)													
Platanus x hybrida (gewone plataan)													
Robinia psuedoacacia (acacia)													
Quercus rubra (amerikaanse eik)													Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit. Exoot niet aanplanten
	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom		dorblad		Droogte gevoelige boom. Blad verdort bij droogte en is dus brandbaar
Quercus petrea (winter eik)													Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				
Quercus robur (zomereik)													Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom				

Uitgangspunt is: waardering in droge periode															
Vegetatie	BEGROEIINGSCYCLUS									REST PRODUCTEN					
	maart - mei			juni - augustus			september - februari			NAALDEN en/of BLADEREN op de grond	TAK & TOPHOUT	HUMUS	Opmerkingen: ■ Groeiseizoen is afhankelijk van de temperatuur in het voorjaar en de droogte in de zomer. ■ Bij een temperatuur van ongeveer 10° C begint de sapstroom in het voorjaar opgang te komen. ■ Bij een droge zomer verloopt de omzetting van vocht naar hars sneller. Hiardoor zijn de naalden van het naaldbout sneller brandbaar.		
	sapstroom in werking			omzetting in hars			hars OF vallen van naalden								
Bos- & Haagplantsoen															
Acer campestre (veldesdoorn)								dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom		dorblad aan jonge boom	dorblad aan jonge boom		
Amalanchier lamarckii (drents krentboompje)															
Acer pseudoplanus (gewone esdoorn)															
Carpinus betules (haagbeuk)								dorblad	dorblad	dorblad		dorblad	dorblad	toplaag	Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
Cornus mas (gele kornoelje)															
Corylus avellana (struik hazelaar)															
Corylus colurna (boom hazelaar)															
Crataegus monogyna (eenstijlige meidoorn)															
Cytisus scoparius (brem)															Brandbaar: wasachtige stoffen. Bloeitijd mei-juni; Beschermde plant
Euonymus europaeus (kardinaalsmuts)												dorblad	dorblad		
Fagus sylvatica (Purpurea) (beuk (rode))															Looizuur in het blad. Droogt in winter aan de jonge boom door de wind snel uit.
Frangula alnus (vuilboom)								dorblad	dorblad	dorblad		dorblad	dorblad	toplaag	
Hippophæe rhamnoides (duindoorn)															zeer brandbaar door wasachtige stoffen, duingebieden
								Bladverliezend	Bladverliezend	Bladverliezend		Bladverliezend	Bladverliezend		
Ilex aquifolium (hulst)															wasachtige stoffen
Juniperus communis (jeneverbes)															wasachtige stoffen
												dorblad	dorblad		
Ligustrum ovalium (haagliguster)															
Populus alba 'Alba' (witte populier)															
Prunus avium (zoete kers)															
Prunus laurocerasus (laurierstruik)															Zeer brandbaar door wasachtige stoffen
														toplaag	
Prunus padus (vogelkers)															
Prunus serotina (amerikaanse vogelkers (bospest))															Bospest Niet aanplanten ivm zaailingen
Prunus spinosa (sierkers)															Brandbaar: Wasachtige stoffen in blad.
Quercus robur (zomereik)															
												dorblad	dorblad		
Quercus petrea (wintereik)															
														toplaag	
Rhamnus catharticus (wegedoorn)															
Rosa canina (hondsroos)															
Sambucus racemosa (trosvlier)															
Sorbus intermedia (lijsterbes)															
Ulex europaeus (gaspeldoorn)															Bloeitijd maart-mei. Brandbaar: wasachtige stoffen.
														toplaag	
Viburnum opulus (gelderse roos)															
Kruidachtige begroeiing															
Agrostis vulgaris (struisgras)												NVT			Bloeitijd: juni-juli
	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd								
Caluna vulgaris (struikheide)												NVT			Bloeitijd: juli tot herfst
					let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd								
Corynephorus canescens (buntgras)												NVT			Bloeitijd: juni - juli
								let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd					
Deschampsia flexuosa (bochtige smele)												NVT			Bloeitijd: juni - juli
Erica carnea (winterheide)												NVT			Bloeitijd: oktober-mei
	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd								
Festuca ovina (ruig schapengras)												NVT			Bloeitijd mei-juni. Is nauwelijks brandbaar.
Molinia caerulea (ruig riet)												NVT			Bloeitijd: juli-september

Uitgangspunt is: waardering in droge periode													
Vegetatie	BEGROEIINGSCYCLUS									REST PRODUCTEN			
	maart - mei			juni - augustus			september - februari			NAALDEN en/of BLADEREN op de grond	TAK & TOPHOUT	HUMUS	Opmerkingen: ■ Groeiseizoen is afhankelijk van de temperatuur in het voorjaar en de droogte in de zomer. ■ Bij een temperatuur van ongeveer 10° C begint de sapstroom in het voorjaar opgang te komen. ■ Bij een droge zomer verloopt de omzetting van vocht naar hars sneller. Hierdoor zijn de naalden van het naaldbos sneller brandbaar
	sapstroom in werking			omzetting in hars			hars OF vallen van naalden						
													
	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd				let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd				
Nardus stricta (borstelgras)									NVT		Bloeitijd: mei - juni		
Osmunda regalis (koningsvaren)									NVT		Is brandbaar als de bladeren verdorren. De wortels zijn brandbaar en lastig te blussen		
	dorre bladeren	dorre bladeren	dorre bladeren				dorre bladeren	dorre bladeren	dorre bladeren	dorre bladeren			
Pteridium aquilinum (adelaarsvaren)									NVT		Is brandbaar als de bladeren verdorren. De wortels zijn brandbaar en lastig te blussen		
	let op bloeitijd	let op bloeitijd	let op bloeitijd				let op dood/dor blad	let op dood/dor blad	let op dood/dor blad	dorre bladeren			
Rubus fruticosus (braam)									NVT		Dore stengels zijn brandbaar tussen herfst en voorjaar		
Vaccinium myrtillus (blauwe bosbes)									NVT		Bloeitijd: april - juni . Brandbaar in herfst als bladeren gaan vallen.		
Vaccinium vitis-idaea (rode bosbes)									NVT		Bloeitijd: mei - juni en Augustus - Oktober. Is altijd groen, brandbaar in droog voorjaar.		
LEGENDA KLEUREN:													
Niet brandbaar													
Nauwelijks brandbaar													
Iets brandbaar													
Brandbaar													
Zeer brandbaar													